

令和8年



ササカわら版

第853号

2026年8月31日発行
三多摩食糧卸協同組合

産地情報(8年産)



【生育】新潟は高温で早い、いぶきの収穫適期到来

登熟期の高温から生育は前倒しで推移しており、新潟市の場合、こしいぶきは8月24日ごろ、コシは9月5日前後に収穫適期を迎える見通し。

収穫適期のめやす(8月18日現在 登熟積算気温 8月19日以降は平年値※1による)

品 種		出穂期	収穫適期の 出穂後積算気温 ※2	収穫適期※3	
こしいぶき	(新潟・五泉)	7月 20 日	925℃	8月 24 日	
	(阿賀)	7月 23 日	975℃	8月 31 日	
コシヒカリ	5/ 5	(新潟・五泉)	7月 30 日	950℃	9月 4 日
	移植	(阿賀)	7月 28 日	1000℃	9月 7 日
	5/10	(新潟・五泉)	8月1日	950℃	9月 6 日
	移植	(阿賀)	7月 31 日	1000℃	9月 10 日
新之助	(新潟・五泉)	8月 9日	1050～1100℃	9月 21 日	
	(阿賀)	8月 8日	1050～1100℃	9月 23 日	

登熟積算気温とは

「登熟」は、穂ばらみ・開花後にデンプンが蓄積して粳や果実が太る時期です。

この期間の「日平均気温」を毎日足し上げたものが登熟積算気温(単位は℃・day)。

積算値がある範囲に達すると、登熟がほぼ完了し、収穫適期に入ったとみなせます。

【生育】北海道は2日早い、茎数多め

8月前半は高温・少雨・多照で進み、15日現在の生育は2日早く出穂期～登熟期を迎えている。茎数はやや多め。

	全体	空知	石狩	後志	胆振
生育遅速	早2日	早2日	早1日	平年並	早1日
草丈 (cm)	並 (+ 3%)	並 (+ 3%)	並 (± 0%)	並 (▲ 1%)	並 (+ 2%)
茎数 (本/m ²)	やや多い (+ 7%)	多い (+ 14%)	やや少ない (▲ 7%)	やや多い (+ 8%)	並 (+ 1%)
葉数 (枚)	並 (+ 0.1)	並 (+ 0.1)	並 (+ 0.1)	並 (▲ 0.1)	並 (▲ 0.1)

	日高	渡島	檜山	上川	留萌	オホーツク
生育遅速	遅2日	平年並	遅1日	早3日	早4日	早2日
草丈 (cm)	並 (+ 2%)	並 (+ 4%)	並 (+ 4%)	並 (+ 3%)	やや長い (+ 5%)	並 (+ 4%)
茎数 (本/m ²)	やや多い (+ 8%)	並 (± 0%)	並 (▲ 3%)	並 (± 0%)	多い (+ 12%)	やや少ない (▲ 9%)
葉数 (枚)	やや早い (+ 0.4)	並 (+ 0.2)	並 (▲ 0.1)	並 (+ 0.1)	並 (± 0.0)	並 (▲ 0.1)

注) 下段カッコ内は平年値との比較。

今週の玄米入荷情報

7年産

福島会津コシヒカリHG

福島中通りコシヒカリ

新潟新之助

北海道ゆめぴりか

岩手ひとめぼれ前沢

宮城ひとめぼれ登米
特栽

山形つや姫特栽

令和8年産 千葉ふさおとめ
成分分析結果(8/21)

アミロース 蛋白 水分 品質評価値
19.6 6.1 14.2 73
新米の香りがあり、硬さ、粘りも程よい。

2027年版 ごはん料理カレンダー
(渥美まゆ美のごはん料理)
手軽でおいしいごはん料理レシピ満載

申込受付中！！
申込期間 2026/9/18まで

名入れ印刷ご希望の方はお早めにお申し込みください。
納品 2026/11中旬～

